

CARATTERISTICHE DEI ROOST DI CHIROTTERI IN EMILIA ROMAGNA

BERTOZZI M.¹, SCARAVELLI D.^{1,2}

¹ Fondazione Chiroptera Italica, via Veclezio 10a, 47100 Forlì

² R.N.O. e Museo di Onferno, Centro Studi Cà Gessi, via Castello2 Onferno, 47855
Gemmano

Il lavoro riassume le caratteristiche dei roost di maggior interesse per i Chirotteri in Romagna (Italia settentrionale) . Sono stati considerati localizzazione, tipologia ambientale, consistenza e struttura di una serie di rifugi ove siano stati rilevati chirotteri o in ambito riproduttivo o in svernamento. La conoscenza delle caratteristiche di detti ambiti è fondamentale non solo per approfondire le conoscenze autoecologiche delle specie ma anche per ottenere indicazioni per la conservazione delle stesse. Le specie considerate sono *Rhinolophus euryale*, *R. ferrumequinum*, *R. hipposideros*, *Myotis blythii*, *Myotis daubentonii*, *M. emarginatus*, *M. myotis*, *M. nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *N. noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus* *Plecotus auritus*, *Plecotus austriacus*, *Miniopterus schreibersii*. Si rileva come oltre agli ambiti ipogei naturali e artificiali, un ruolo prioritario sia rappresentato dagli edifici. Infine alcune considerazioni sulla gestione di questi ambienti vengono proposte.